


5^e juillet 1741

Essai

Sur quelques accidens de la
Vision



ARC 39 n° 203



Essai

Sur quelques accidens de la Vision.

Dans l'Etat ordinaire des parties qui appartiennent ou qui ont rapport aux yeux le même objet nous paroît simple avec un double organe de la vue ; mais cet Etat étant changé, ce même objet nous paroît multiplié entièrement ou en partie, et quelques fois malgré ce changement nous le voyons encore simple. Qu'on me permette de désigner désormais ces divers Etats par unité et multiplicité de la Vision.

On Sait qu'il y a un grand nombre d'accidens qui jettent la vision considérée de cette manière. j'en ay envisagé deux qui me paroissent demander une attention plus particulière. ils dépendent de la Lésion des deux principaux organes de la Réfraction, la cornée et le Crystallin.

Le Crystallin dans sa position naturelle et régulière, a les Centres de ses convexités dans deux points de l'axe de l'oeil, et il est parallèle à la cornée. or le point de la vision distincte étant toujours celui qui termine les axes visuels sur un objet, il paroît évident que les yeux n'ont la liberté de se mouvoir en tous sens, qu'afin que leurs axes soient toujours terminés sur l'une et sur l'autre Rétine au même point.



correspondants.

fondé sur cette Loy il est naturel de penser que les Ners optiques partant d'une commune origine la fibre de l'un aboutit dans les Couches ou Reservoirs de ces ners au même point que la fibre correspondante de l'autre; qu'ainsi ces deux fibres nerveuses partant sur le même lieu de leur source la même image elles n'y en impriment qu'une:

Lorsque le Crystallin est incliné sur la Cornie, ou que son Centre est placé hors de l'axe de l'œil, cet axe tombe sur un point oblique il se brise et va frapper un point de la Retine bien différent de celui où l'axe de l'œil régulier fait son impression: ces deux fibres nerveuses ne concourent point dans le cerveau, elles aboutissent à deux points différens dont chacun peut se charger séparément de l'impression qu'il reçoit; d'où l'on reçoit ainsi deux sensations détachées, distinctes et semblables du même objet. mais ce Cas est très rare; parce que peu de causes peuvent y donner lieu et parce que le plus souvent le Crystallin n'est dérangé que relativement au dérangement réel et propre de la Cornie, et qu'alors l'unité de vision subsiste.

on observe que la poche Lenticulaire faite par l'écartement mutuel de la Membrane externe et

interne du Vitre et qui enclasse le Crystallin à sa
paroi antérieure plus épaisse et plus élastique. on
l'a vu composé de deux lames unies par un tissu
Celluleux très fin. on soupçonne avec bien des
anatomistes que la lame la plus antérieure est la
Rétine qui se glisse à travers les plis des procès
Ciliaires.

Au bord de l'écartement des deux Lunettes vitrées
on observe facilement dans les yeux du Boeuf plus
difficilement dans les yeux de l'homme une
insertion de filaments Membraneux unis l'un avec
l'autre qui paroissent se prolonger sous les procès
ciliaires et se terminer à la Rétine.

~~On croit que c'est~~ C'est
~~une espèce de membrane~~ cette espèce de membrane
qu'on croit être la Rétine amincie et qui se glisse
sous les procès ciliaires pour venir recouvrir la face
antérieure du Crystallin. lors qu'avec le tranchant
d'une Lancette on incise ces filaments parallèlement
à l'équateur et au milieu de leur étendue, et qu'avec
ce même tranchant on les pousse de part et d'autre
vers leurs insertions en ratissant légèrement sur la
membrane vitrée, on voit qu'ils s'ont adhérents à
la Circonférence du Chaton du Crystallin et qu'ils



s'attachent à la membrane externe du vitré à
l'endroit désigné. Si on en coupe diamétralement
deux parties qui sont à distance régulière les
travailles ensemble par un moyen d'extension
dignes qu'on fasse une section demi-circulaire à la
circonférence du chaton les deux parties s'écartent
s'écartent de la ligne d'incision et le cristallin prend
une figure qui ne ressemble point à une lentille,
mais à une espèce de sphéroïde.

Ces observations semblent autoriser le raisonnement
suivant.

on voit les objets éloignés sous un angle plus petit
que les objets voisins: ceux-ci auront donc dans l'état
naturel ou dans l'infraction des parties réfractives
le foyer de leurs Rayons presque toujours au delà
de la Rétine et les autres en deçà; il faut
par conséquent que dans ces diversités d'angles
visuels quelque changement proportionnel place
toujours sur la Rétine le foyer des Cones Lumineux.
le Cristallin seul peut le faire. quelques uns disent
qu'il avance lorsque l'œil est allongé par la
pression commune des Muscles droits ou par
celle des Muscles obliques; mais il me paroît

plus naturel de donner et offus à la membrane
antérieure du Crystallin conjointement avec
~~venir qui s'étendrait depuis le bord de la Capsule~~
~~Les procès ciliaires =~~
~~parque la charnière s'envenime et terminée dans la partie~~
~~antérieure du globe =~~ d'autant mieux que leur
jeu réciproque semble pouvoir rendre le Crystallin
plus ou moins convexe, accident qui, selon la
pensée d'un Savant Médecin Hollandois (1) est
nécessaire pour conserver l'exactitude, la promptitude
et la facilité avec laquelle le degré de la
Refraction se trouve toujours proportionné
aux divers angles de vision dans les grandes
proximités et distances des objets et qu'on ne
pourroit bien expliquer en supposant simplement
que le Crystallin s'avance et se remet en première
situation.

Supposant donc avec bien de la vraisemblance que
la Membrane antérieure de la Capsule est la
Rétine, on peut dire que les Rayons partant
d'un objet voisin font d'abord sentir leur plus
grande intensité sur cette Membrane toute nerveuse,
celle-ci irritée et comme stimulée conçoit une

(1) Gravesande.



Espèce de spasme toujours proportionnel au degré
 d'intensité de la Lumière : par la saliniformité de la
 Capsule rétrécie ~~tant~~ augmentant la convexité
 postérieure et peut-être ~~un peu~~ un peu la Latérale :
 la Circonférence rétrécie ~~proportionnellement~~
 s'ajuste toujours au calibre de son Chaton, ^{à qui} ~~par~~
 contribue l'humour aqueux renfermé entre la capsule et le
~~matériau rigide et opaque~~ ^{corps du cristallin} ~~et la capsule~~
 celle-ci doit être proportionnée à la longueur de l'axe
 pour la vision mais d'autant moins grande la lumière
 est plus faible ~~par~~ par conséquent les yeux sont
 de plus en plus grand à mesure que le cristallin
 perd sa transparence et de plus en plus petit
 même à mesure que le degré de proximité de l'objet
 est de plus en plus grand et de plus en plus petit. Enfin
 on voit que les Rayons trouvant une Cause de
 Refraction capable de placer leur foyer sur la
 Rétine l'objet d'où ils émanent y est toujours plus
 distinctement, mais ~~par~~ la cause de la Refraction
 étant dérangée la vision est confuse parce que les
 foyers imaginaires des Rayons qui portent la même
 image d'un point, ne concourant point sur

l'organe immédiat de la vue, la section des Cones
Lumineux & fait la projection de l'objet multiplié
dans tous les points plus ou moins distinctes et
disjointes en parties l'une de l'autre

on peut ajouter que les procès ciliaires sont
comme les antagonistes de la membrane nerveuse du
crystallin : or le balancement de ces deux forces
antagonistes est la point de leur équilibre. mais
lorsque l'œil n'agissant plus sur la membrane nerveuse
dans la trop grande distance des objets le cristallin
aimant à être moins convexe pour briser avec moins
de force les rayons qui partent de ces objets sous des
angles plus petits, les procès ciliaires agissent : cette
contraction diminue l'arc qu'ils forment ; par là ils
pressent sur le humeur vitré, et en même temps
qu'ils apploissent le cristallin ils s'approchent plus de
la cornée. (cette hypothèse paroit mieux rendre compte des phénomènes
de la vision.)

Je passe à un autre accident qui a Rapport
à la Cornée.

on considère la Cornée comme un petit Segment
de Sphère, de manière que leur Centre se trouve dans
deux points de l'axe de l'œil. cette conformation
est constante dans l'économie Régulière du



Globe.

Selon un Célèbre Chirurgien oculiste (2) le
dérangement des axes visuels sans altération
de la vision dans son unité, vient de l'excentricité
du petit Segment, c'est à dire de sa position irrégulière
et par conséquent de son obliquité quelconque sur
l'axe de l'œil.

Quelque singulier que paraisse d'abord ce
sentiment présenté sous ce seul point de vue
très vague, peut être paroitrait-il s'approcher
de la vérité lors qu'il sera mis dans son jour.
comme je me suis attaché à développer ce
sentiment, il étoit à propos de parler au paravant
du Crystallin, parce qu'il faut combiner les effets
reciproques de cette humeur et de la Cornée.


Bien des personnes sont Louches et leur vue
est régulière, il est démontré par des Loix
incontestables d'optique ^{lorsque} que cet équilibre d'un
œil ^{est} étant rompu, les parties propres au Globe
étant dans leur état naturel, on doit voir les
objets doubles, par conséquent il faut qu'il le
(2) M. Vitre Jean.

dérangements réel de ces mêmes parties -
rende à l'œil son équilibre. Et le luy étant pour
ainsi dire, encore d'une façon contraire. ces parties ne
pourroient être que la cornée et le cristallin.
organes principaux des Refractions de l'œil
peuvent en disposer de manière que l'axe
visuel brisé sur l'un obtienne de l'autre
par une réfraction contraire une détermination
nécessaire pour concourir sur l'objet avec l'autre
axe et telle qu'il auroit eu nécessairement
s'il étoit entré dans un œil régulier; parce qu'il
va aboutir à un point de la Rétine où se
termine la direction selon la quelle il représente
l'objet comme à travers le centre de la prunelle
qu'il traverseroit perpendiculairement
pour aller concourir sur le point objectif.
Si l'œil étoit en équilibre avec l'autre; &
par conséquent les deux axes ayant une
détermination propre à concourir sur un
point de l'objet, et affectant le même point



correspondant sur l'une et sur l'autre Retine
selon cette Direction, il n'est pas étonnant que
la plupart de ces personnes jouissent de
l'unité de vision.

La juste Idée de cette double Refraction
se prend dans les Loix de l'optique. Le Crystallin
doit toujours avoir une inclinaison contraire à celle
de la Cornée, parce qu'il faut que par la réfraction
l'axe en reçoive une détermination contraire
à celle qu'il a reçu sur la Cornée.



En effet le point envisagé étant en A, je

Suppose que l'œil droit B ait le centre de la
 prunelle plus éloigné du grand angle que celui
 de l'autre œil M : l'axe visuel AB sera oblique
 sur le sommet plus distant B de la cornée —
 représentée par la ligne DC , il se brisera
 sur le sommet B en s'approchant de la
 perpendiculaire et par conséquent en s'éloignant
 du point de concours A . or si le plan du
 Crystallin FE étoit parallèle à celui de la
 prunelle ou de la cornée DC , ou s'il étoit
 plus incliné dans le même sens l'axe TH —
 rebaisé sur ce second plan s'écarteroit encore
 plus du point de concours A ; il est donc
 nécessaire que ce second plan FE soit incliné
 en un sens opposé, c'est à dire sur le grand
 angle par rapport à l'inclinaison de la cornée
 DC . il en fera de même dans les variations.

Ces mouvements contraires dont l'appareil
 paroît fort simple résulte d'un même accident
 non seulement simple et possible mais nécessaire
 partout où l'accident dont il s'agit peut se
 trouver. je m'explique.




Je dis donc que lorsque une jeune
Personne regarde assidûment et sans
détourner la tête un objet très oblique au
plan commun de ses yeux, il arrive que

le Muscle antagoniste de celui qui tire le
globe à force d'être allongé contracté avec
le temps une espèce de Relâchement; il
cede: il se prête aux ardens tiraillements;
et comme on peut penser qu'un des principaux
usages du Ligament ciliaire est d'obvier à
l'excentricité de la cornée en détruisant la
facilité qu'auroit la Sclérotique de glisser —
un peu sur la Choroïde et qu'en cela son
office se trouve en partie combiné avec
celui du Muscle qui contrebalance la forte
contraction dans les mouvements très obliques,
il suit que leur force dépendant mutuellement
l'une de l'autre leur affaiblissement est
aussy réciproque: Les Lames de la Sclérotique
souffrent quelque extension: le Tisseu
vitreux ou cellulaire des Lames
membraneuses s'allonge et par là la lame
interne ou Ruychiene de la Choroïde sur
laquelle la Rétine est étendue n'en souffrant
aucune altération ne peut faire obstacle:



Enfin la Cornée devient excentrique sans
aucun changement de sa convexité; parceque
les tendons des muscles droits semblent
principalement s'épanouir et s'unir mutuellement
afin q'ou chacun embrassant la demie
circonférence du Ligament ciliaire concentrique
à celle de la Cornée, tire également tous les
points correspondans.



À mesure que la Cornée DC s'incline sur
l'axe en s'en éloignant, le Crystallin EF dont

L'aposition fixe est indépendante de celle de
la cornée restée en place, et de son immobilité
on déduit qu'il obtient une inclinaison contraire
et proportionnelle. la cornée étant devenue
excentrique, son sommet s'éloigne de l'axe.
celuy-ci qui tombe toujours sur ce sommet
B se brise et de son obliquité comme de son
excentricité on peut bien inférer que la force
de la Réfraction est telle que le Rayon se
brise est ramené sur le sommet H de la surface
du Crystallin, et que là se brisant encore selon
la direction legitieme de l'axe GH, il continue
cette même Route pour aller affecter le point
de la Rétine G correspondant à celui de l'autre
œil M, et pour concourir sur l'objet selon la
Direction AG égale à la Direction AM comme
si l'œil B étoit vraiment en équilibre avec
l'œil Z.



Ce Detail fait voir la facilité que l'en-
fance a de contracter presque toutes les
Especes de cette Maladie lors qu'imprudemment

ils sont mis habituellement par leur Nourrice —
dans une position où le jour qu'ils regardent —
sans être frappé leurs yeux plus ou moins —
obliquement, il démontre aussi la possibilité
de réformer ce vice, mais seulement dans —
l'âge tendre, car une longue habitude le fortifie :
l'attention continuelle exténuée peu à peu la
force du Ressort qui auroit pu contribuer à remettre
les parties en situation, et les tuniques devenues
comme raidies ne sont plus propres à se prêter
aux tiraillements qui pourroient réduire la
Cornée : de plus l'âge ayant fourni la moindre —
connoissance, la vue est trop dissipée par les
objets qui la frappent pour pouvoir se fixer
habituellement sur un seul point de vue.

Ce sentiment est fortifié par les —
Raisons naturelles qu'il fournit au ~~seul~~
observation anatomique de M^r Winslow —
sur la largeur de l'vue et de la Couronne —
Ciliaire ordinairement plus grande du côté du
nez que du côté du Temple et sur l'ovale

décrit par la circonférence externe de la cornée
et dont le grand Diamètre est parallèle, à la ligne
tirée du Centre d'un globe, à l'autre; En effet ex-
pendant les trois quarts de la vie les Muscles
adducteurs sont plus ou moins contractés &
pour faire former aux axes les divers angles
de vision. L'extrémité de ces Muscles au fond
de l'orbite étant le point fixe, le point mobile
des tiraillements doit être surtout aux
extrémités de l'axe et du cercle filiaire, &
c'est à dire à leur commissure avec les muscles
antagonistes ou abducteurs : mais comme les
extrémités sont retenues elles résistent, et
par là les points voisins sont obligés de
céder un peu et de concourir à une extension
que l'habitude rend aisée et nécessaire. voilà
un commencement de Strabisme mais qui
n'est point apparent parce que l'excentricité
n'est pas considérable. Ce défaut est bien
plus remarquable chez ceux qui ont eu de très
bonne heure la vue courte; les Muscles



adducteurs plus contractés pour faire former
aux axes un plus grand angle visuel en l'égard
à la nécessité de regarder les objets de près &
tiraillements et par conséquent allongent plus
leur parties dont il s'agit : ainsi arrive-t'il
que plus l'objet envisagé par ces personnes
est éloigné, plus leur Regard paroît louche ; &
parce qu'à une certaine distance les axes
visuels différant très peu du parallélisme, &
l'Inclinaison de la Cornée est bien plus
remarquable.

